



L9301

Druh: Eucalyptus gunnii**Odrůda:** Silverdrop

Stálezelená letnička, šedivo-zelené kulaté listy, červenohnědé stonky.

Firma: Benary**Forma osiva:** Natural**Délka kultury:** 15-18 měsíců**Užití:** kobercové výsadby, k řezu**Výška:** 50 cm**Expozice:** Slunce**CENA:** 820,00 Kč (1000 semen)**Použití**

Hrnková květina, vhodná i do kobercových výsadeb. Exotické listy lze použít i k řezu, do květinových aranžmá.

Výsevní termín

Leden až březen, ale možné po celý rok.

Způsob výsevu

1 semeno do jedné cely sadbovače.

Klíčení

4-9 dnů při teplotě 20-25 °C. Ke klíčení potřebuje světlo, proto semena nezasypáváme, jen lehce přimáčkneme k substrátu. Nutné udržovat jednotnou vlhkost substrátu, nesmí vyschnout. Přisvětlování je při klíčení vhodné, ale ne nutné. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Od druhé fáze snížíme teploty na 18-20 °C, snížíme také vlhkost substrátu.

Následné pěstováníPřesazování rostlin po 4-6 týdnech do 10-15 cm květináčů. K řezu: 4-5 týdnů po pikýrování přesazení 1 rostliny do 5 l nádob nebo volně do skleníku (16 rostlin na m²) nebo na venkovní stanoviště 3-5 rostlin na m². Pěstování venku je možné, pokud nejsou rostliny vystaveny mrazu.**Substrát**Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-15 % perlitu, 3 kg/m³ kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-7,0. Venkovní pěstování: jílovité půdy s dobrou drenáží. Nízké nároky na půdu. Základní hnojení: 100-150 g/m² pomalu se uvolňujícího hnojiva.**Teploty**

Pěstování při teplotách 16-18 °C. Aby byl zajištěn růst, nemohou teploty klesnout pod 12 °C. Rostliny mohou přezimovat při teplotách 3-4 °C, nesmí být vystaveny mrazu.

HnojeníVysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 200-300 ppm dusíku (při 0 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Těsně před řezem aplikujeme draselné hnojivo (poměr N:K₂O je 1:1,5). V zimě hnojíme ve 4 týdenních intervalech. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa

<p>předejdeme deficitu železa. Eucalyptus toleruje vysoké množství solí v substrátu, to by ale nemělo převýšit 5 g/l. Venkovní pěstování: na základě půdní analýzy, lze upravit 150 g/m² pomalu se uvolňujícího hnojiva aplikovaného v několika dávkách. Sledovat je také nutné mikroelementy.</p>

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.