



R3240P

<b>Druh:</b> Lobelia fulgens	
<b>Odrůda:</b> Queen Victoria	
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Šarlatově červené květy a bronzové listy. Výborná k ohraničení záhonů a do kobercových výsadeb.	
<b>Firma:</b> Benary	<b>Expozice:</b> Slunce-částečný stín
<b>Délka kultury:</b> 20-28 týdnů	<b>Forma osiva:</b> Pelety
<b>Výška:</b> 75 cm	<b>Užití:</b> kobercové a krajinářské výsadby, k řezu
<b>Teplotní zóna:</b> 9-2	
<b>Chladnostní zóna:</b> 7-9	
<b>CENA:</b> 355,60 Kč (1000 pelet)	

<b>Použití</b>	Trvalka vhodná k ohraničení záhonů, do kobercových výsadeb a k výsadbě do nádob. Výborná také k řezu.
<b>Výsevní termín</b>	Leden až březen pro produkci kvetoucích rostlin od července dále; červen-srpen pro kvetoucí rostliny v následujícím roce; duben-květen pro venkovní produkci určenou k řezu.
<b>Způsob výsevu</b>	1 semeno do jedné cely sadbovače při pěstování za krátkodenních podmínek. 3-5 semen do jedné cely sadbovače při pěstování za dlouhodobých podmínek, protože rostliny tvoří listovou růžici.
<b>Klíčení</b>	10-14 dní při teplotách 18-22 °C. Klíčí na světle, výsev jen lehce přimáčkneme. Substrát udržujeme vlhký, ale ne mokrý. Od fáze 2 snížíme teplotu na 15-18 °C, snížíme i vlhkost substrátu.
<b>Následné pěstování</b>	8-10 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 13-16 cm květináčů nebo po 2-3 rostlinách do 5-10 l nádob. Při pozdějším výsevu je možné také přesadit po 3 rostlinách do 13-15 cm nádob, pak rostliny bohatě kvetou. Venkovní pěstování: 4-6 týdnů po pikýrování vysazujeme na stanoviště ve sponu 25-30x25-30 cm. Vernalizace není nutná. 7-8 týdnů po přesazení udržujeme dlouhodobní podmínky.
<b>Substrát</b>	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m <sup>3</sup> kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-7,0. Venkovní pěstování: písčité půdy s humusem a dobrou drenáží. Standardní vyhnojení 60-80 g/m <sup>2</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva.
<b>Teploty</b>	Pěstování při teplotách 15-18 °C, později (když rostlina dobře prokořenila v květináči) snížíme teplotu na 10-15 °C. Venkovní pěstování je možné. V zimě teploty ve skleníku 3-5 °C nebo můžeme přechovat venku, pak je nutné rostliny přikrýt. L. fulgens je velice citlivá na velké mrazy. Na jaře rostliny začínají růst při 15-18 °C. Nízké teploty 10-12 °C prodlouží kultivační dobu. Chladná fáze (vernalizace) není pro květní indukci nutná.

<b>Hnojení</b>	Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku (při 0 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku. Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Pěstování venku: na základě půdního rozboru můžeme půdu vyhnojit 60-80 g/m <sup>2</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva, to aplikujeme v několika dávkách.
----------------	---

*Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.*