



K3418

<b>Druh:</b> Delphinium grandiflorum	
<b>Odrůda:</b> Blue Mirror	
Trvalka kvetoucí v prvním roce, není nutná vernalizace.	
<b>Firma:</b> Benary	<b>Expozice:</b> Slunce- částečný stín
<b>Délka kultury:</b> 16-20 týdnů	<b>Forma osiva:</b> Natural
<b>Výška:</b> 50 cm	<b>Užití:</b> kobercové a krajinářské výsadby
<b>Teplotní zóna:</b> 6-1	
<b>Chladnostní zóna:</b> 3-7	
<b>CENA:</b> 280,00 Kč (1000 semen)	

<b>Použití</b>	Vhodná do kobercových výsadeb. Použití i jako hrnková a do nádob.
<b>Výsevní termín</b>	Letnička: prosinec až květen; trvalka: polovina srpna až polovina září.
<b>Způsob výsevu</b>	2-3 semena do jedné cely sadbovače.
<b>Klíčení</b>	Fáze 1: 14-18 dní při teplotě 20-22 °C; fáze 2: 15-20 dní, teplota 17-20 °C; fáze 3 a 4: 20-25 dní při teplotě 13-17 °C. Semena po výsevu lehce zasypat vermikulitem a udržovat stejnou úroveň vzdušné vlhkosti i vlhkosti substrátu. Od fáze 2 snižujeme vlhkost substrátu. Ve fázi 3 a 4 začínáme s hnojením 50-75 ppm dusíku, ve fázi mladých rostlin dbáme na to, aby byl v hnojivu nízký obsah fosforu.
<b>Následné pěstování</b>	6-9 týdnů po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 9-10 cm květináčů nebo 3 rostliny do 13-15 cm nádob.
<b>Substrát</b>	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (kůra, písek, perlit), 1-2 kg/m <sup>3</sup> kompletního vyváženého hnojiva, 2-4 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), chaláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5.
<b>Teploty</b>	Pěstování za teplot 13-16 °C, od 20 °C nutné větrat. Teploty pod 13 °C v kombinaci s krátkým dnem podporují vegetativní růst a potlačují květní tvorbu. Teploty nad 30 °C vedou k deformacím květů. Přezimování je možné v suchých půdách, nesmí zmraznout, teploty 3-5 °C. Rychlení 8-10 týdnů při teplotě 15-20 °C.
<b>Hnojení</b>	Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při 2 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu) kompletním vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po kvetení nebo po začátku září! Na jaře hnojte 130-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa předejdeme deficitu železa. Hnojení pomalu se uvolňujícím hnojivem je vhodnější, jelikož jsou kořeny velice citlivé na vysoké zasolení substrátu. Je lepší hnojit

několikrát nižšími koncentracemi hnojiva než méně často vyššími.



*Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.*