



Mix Y5935

Druh: Zinnia elegans**Skupina:** Benary's Giant

Skupina zinníí, které mají velké plné květy na pevných stopkách. Velice dobrá k řezu. Květ 10 cm.

Firma: Benary**Forma osiva:** Natural**Délka kultury:** 9-10 týdnů**Užití:** kobercové výsadby, k řezu**Výška:** 100 cm**Expozice:** Slunce**CENA:** 570,00 Kč (1000 semen)

Použití	Skupina vhodná do kobercových výsadeb, k řezu a k pěstování v nádobách. Květy lákají včely a motýly.
Výsevní termín	Rychlení ve skleníku: únor až březen pro produkci kvetoucích rostlin od července dále; rychlení venku (mimo mráz): konec května; můžeme vysévat i přímo na stanoviště.
Způsob výsevu	1 semeno do jedné cely sadbovače.
Klíčení	Fáze 1: 1-5 dní při teplotě 21-23 °C, substrát nesmí být příliš mokrá. Fáze 2: 5-7 dní po výsevu, teplota 20-21 °C, snižujeme vlhkost substrátu. Fáze 3: 7-10 dní od výsevu, teplota 18-20 °C. Fáze 4: 10-14 dní po výsevu, teplota 15-18 °C. Výsev zakryjeme tenkou vrstvou vermikulitu. Od konce května je možné vysévat také přímo na stanoviště. Od fáze 2 hnojíme mladé rostliny 0,1 % hnojivem, díky tomu jsou sazenice kvalitnější. Příliš vysoké teploty mohou zhoršovat klíčení.
Následné pěstování	Po 3 týdnech od výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-11 cm květináčů nebo packů nebo po 3-4 rostlinách do 5-10 l nádob. Čím dříve se rostliny nahrnkují, tím je lepší kvalita. Pěstování venku: 4-6 týdnů po výsevu přesazujeme na stanoviště do řad ve vzdálenosti 18-25 cm. Používáme podpůrné sítě.
Substrát	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m ³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,2. Venkovní pěstování: jílovité nebo písčité půdy s dobrou drenáží a obsahem humusu, standardní vyhnojení 80-100 g/m ² pomalu se uvolňujícího hnojiva.
Teploty	Pěstujeme při teplotách 15-16 °C nebo venku. Teploty pod 10 °C vedou ke žloutnutí listů. Zinnie dobře snáší vysoké teploty okolo 25 °C, ale nesnáší mráz. Před prodejem se doporučuje otužovat rostliny teplotami 12-14 °C. Při venkovním pěstování volíme spíše slunné lokality, chráníme před větrem.
Hnojení	Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nadbytek dusíku způsobuje slabé stonky, které se lámou. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo

nedostatku hořčíku, nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Kořeny jsou citlivé na zasolení substrátu. Venkovní pěstování: minimální obsah N v půdě 120 g N/m².

V nabídce ve 13 barvách a směsi (Y5935).



Golden Yellow
Y5051



Lilac
Y4841



Lime
Y5011



Bright Pink
Y5711



Deep Red
Y5281



Orange
Y5081



Purple
Y5631



Salmon Rose
Y5001



Carmine Rose
Y5021



Scarlet
Y5901



White
Y5331



Wine
Y5861



Coral
Y5841

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.