



Mix SY1099

Druh: Catharanthus roseus (Vinca)**Skupina:** Cora F1

Kompaktní rostliny, velké květy. Výborně se jí daří na teplých a slunných lokalitách. Odolná k Phytophthora.

Firma: Syngenta**Velikost nádoby:** 10-12 cm**Termín kvetení:** IV-X**Zaštipování:** Ne**Prodejní měsíc:** IV-IX**Regulátory růstu:** Pokud je to nutné**Výška:** 25-35 cm**Expozice:** Slunce**Forma osiva:** Natural**Délka kultury po přesazení:** 8-11 týdnů**CENA:** 1362,00 Kč (1000 semen)

Použití	Vhodná pro pěstování ve velkých nádobách. Miluje teplo a slunné lokality.
----------------	---

Kvetení	Neutrální k délce dne – vysoké množství světla a teploty vyšší jak 24 °C podporují kvetení.
----------------	---

Výsevní termín	Únor-březen.
-----------------------	--------------

Způsob výsevu	1-2 semena do jedné cely sadbovače.
----------------------	-------------------------------------

**Klíčení
(Fáze 1)**

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků.

Kořínek se objeví za 7 dní.

Zasypávání: Semena je možné zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby byla zajištěna tma a optimální vlhkost.

Substrát: pH 5,5-5,8; EC do 0,5-0,75. Pravidelně kontrolujte pH substrátu, jelikož Vinca zvyšuje pH o 0,5-1. Substrát by neměl být příliš stlačený, aby mohly kořeny bez problému prorůst.

Světlo: Tma je nutná pro klíčení.

Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-7.

Vzdušná vlhkost: 100 % po dny 1-7.

Teplota: 24-25 °C:

Hnojení: Udržujte EC 0,5-0,75.

**Mladé rostliny
(Fáze 2-4)**

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení (prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).

Fáze 2:

- Den 8-16
- Snížíme vzdušnou vlhkost na 40 %.
- Substrát: pH 5,5-5,8 a EC 1-1,25
- Světlo: 20 000-30 000 lux
- Vlhkost substrátu: Střídáme mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3), substrát by měl proschnout na stupeň 3 během 18 hod.

	- Teplota: Jakmile jsou patrné děložní lístky, tak snížíme teplotu na 24-25,6 °C. - Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 60-100 ppm dusíku. - Fungicidy: Preventivně aplikujeme postřik mezi dnem 7 a 10. Fáze 3 a 4: Substrát: pH 5,5-5,8; EC 1,25-1,5. Světlo: 35 000-50 000 lux. Teplota: 24-25,6 °C. Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Pokud substrát vyschne více než na stupeň 2, mohou se poškodit kořeny. Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 75-125 ppm dusíku. Regulátory růstu: Pokud je to nutné, lze aplikovat B-Nine (daminozide) v koncentraci 1 500-2 500 ppm. Fungicidy: Doporučuje se aplikovat fungicidy.
--	--

Následné pěstování	Přesazení: Rostliny jsou prodejné za 36-70 dní od přesazení. Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,7-2,0. Světlo: 50 000- 75 000 lux. Teploty: 24-25,5 °C. Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 4. Vzdušná vlhkost: 40 %. Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 100-150 ppm dusíku. Regulátory růstu: Pokud je to nutné, lze aplikovat B-Nine (daminozide) v koncentraci 2 500-5 000 ppm. Fungicidy: Doporučuje se aplikovat fungicidy.
---------------------------	--

Choroby a škůdci	Choroby: Rhizoctonia, Pythium Škůdci: mšice, smutnice
-------------------------	---

V nabídce 10 barev a směs (SY1099).



Apricot
SY1095



Burgundy
SY1096




Deep Lavender
SY1097



Lavender
SY1098



Mix
SY1099



Pink
SY1100



Punch
SY1101



Red
SY1102



Strawberry
SY1103



Violet
SY1104



White
SY1105

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.