



Mix X3981

| | |
|--|---|
| Druh: Viola wittrockiana | |
| Skupina: Joker | |
| Skupina, která vyniká svojí odolností. Vhodná pro jarní i podzimní prodej. | |
| Firma: Benary | Forma osiva: Natural |
| Délka kultury: 25-27 týdnů (jaro), 12-14 týdnů (podzim) | Užití: krajinářské a kobercové výsadby |
| Výška: 13 cm | |
| Expozice: Slunce-částečný stín | |
| CENA: 176,00 Kč (1000 semen) | |

| | |
|---------------------------|---|
| Použití | Atraktivní skupina do krajinářských a kobercových výsadeb, okenních truhlíků a do nádob. |
| Výsevní termín | Podzimní prodej: počátek července; jarní prodej (pěstování vevnitř, bez mrazu): konec srpna až polovina září; jarní prodej (pěstování v nevytápěném skleníku): počátek srpna až počátek září. |
| Způsob výsevu | 1-3 semena do jedné cely sadbovače, možné také vysévat přímo na stanoviště. |
| Klíčení | 4-7 dní při teplotě 15-18 °C. Semena po výsevu lehce zasypeme vermikulitem. Substrát nemůže být příliš vlhký. Fáze 2: 5-8 dní při teplotě 15-18 °C, fáze 3 a 4: 4-5 týdnů při teplotě 13-16 °C. Týdně hnojíme 100 ppm N, střídáme hnojiva 20-10-20 a 14-0-14. Před výsevem venku je nutné nejprve půdu dobře prokypřit, odplevelit a zajistit kapkovou závlahu. Po snadnější výsev je vhodné použít secí stroj. Porost je nutné pravidelně plet a chránit ho před přímým sluncem. |
| Následné pěstování | Přesazujeme za 6-7 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. Volíme 10-11 cm květináče nebo packy. Pěstujeme při teplotě 10-13 °C. Týdně hnojíme 100-150 ppm N, používáme hnojivo 14-0-14, díky tomu dobře rostou kořeny a rostliny jsou kompaktní. |
| Substrát | Používejte dobře propustný pěstební substrát se 1,5 kg/m ³ kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m ³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. Venkovní pěstování: písčité půdy s dobrou drenáží a obsahem humusu, standardní vyhnojení 40-60 g/m ² pomalu se uvolňujícího hnojiva. |
| Teploty | První dva týdny po přesazení, nebo dokud kořeny rostliny neprokoření až na dno nádoby, udržujeme denní teploty 18-19 °C a noční 20-21 °C. Jakmile jsou rostliny dobře zakořeněné, tak můžeme teploty snížit na 16-18 °C. Nejkratší kultivační doby dosáhneme při 19 °C. Noční teploty pod 15 °C podporují tvorbu květů. V zimě chráníme před mrazem. |

Hnojení

Nízké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100 ppm dusíku (při 0 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), aplikujeme hnojivo s dusičnanem draselným (poměr N:K₂O je 1:1,5). Rostliny přijímají živiny do teploty 5 °C. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Na podzim a na jaře hnojíme s každou zálivkou. Na jaře hnojíme 100 ppm dusíku hnojivem s dusičnanem draselným. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Teploty pod 10 °C znesnadňují příjem železa, proto jím hnojíme při vyšších teplotách. Obzvláště na jaře je nutné pravidelné a dostatečné hnojení, jinak jsou rostliny žluté a mají velice nízkou kvalitu. Kořeny jsou citlivé na zasolení substrátu, proto raději hnojíme nižšími koncentracemi, ale častěji. Venkovní pěstování: hnojení na základě půdního rozboru, vyhnojení 40-60 g/m² pomalu se uvolňujícího hnojiva v několika dávkách.

V nabídce 6 čistých barev a směr.



X 3881
Jolly® Joker



X 3834
Light Blue



X 3721
Mahogany & Gold



X 3871
Poker Face



X 3921
Red & Gold



X 3941
Violet-Gold



X 3981
Mix

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.