



B4031

<b>Druh:</b> Arabis caucasica	
<b>Odrůda:</b> Compinkie®	
Koberec drobných růžových kvítků a stálezelených listů.	
<b>Firma:</b> Benary	<b>Expozice:</b> Slunce-částečný stín
<b>Délka kultury:</b> 8 měsíců	<b>Forma osiva:</b> Natural
<b>Výška:</b> 15 cm	<b>Užití:</b> skalka, kobercové výsadby
<b>Teplotní zóna:</b> 8-1	
<b>Chladnostní zóna:</b> 3-7	
<b>CENA:</b> 339,00 Kč (1000 semen)	

<b>Použití</b>	Odrůda určená pro skalky. Květy lákají včely. Vhodné pro extenzivní střešní výsadby.
<b>Výsevní termín</b>	Výsev od ledna do června pro nekvetoucí sadbu, počátek srpna až polovina září pro kvetení v týdnu 8.
<b>Způsob výsevu</b>	1-3 semena do jedné cely sadbovače.
<b>Klíčení</b>	6-12 dní při teplotě 18-21 °C. Zaséváme 1-3 semena do cely s dobře propustným substrátem. Semena lehce zasypane vermikulitem. Na konci fáze 1 snižujeme teplotu na 16-18 °C. Nepřelévat.
<b>Následné pěstování</b>	Přesaďte rostliny do dobře propustného substrátu. Jakmile zakoření, pěstujte při 13-18 °C. Pro iniciaci kvetení je nutné 8 týdnů vernalizace. Může být rychlena při 7 °C po dobu 3-5 týdnů.
<b>Substrát</b>	Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 % organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra), 1-1,5 kg/m <sup>3</sup> kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-6,5.
<b>Teploty</b>	Pěstování při teplotě 12-15 °C nebo venku. V zimě ve skleníku při 3-5 °C nebo venku, kde je ale nutné rostliny zakrýt textilií. Na jaře začnou rostliny růst, když je 8-10 týdnů teplota mezi 10-15 °C nebo za 5-6 týdnů, kdy jsou teploty 15-18 °C.
<b>Hnojení</b>	Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 3 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití hnojiva s poměrem N:K <sub>2</sub> O 1:1,5. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojení 100-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu.

*Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.*