



Mix SY1110

Druh: Catharanthus roseus (Vinca)**Skupina:** Cora Cascade F1

Převislá. Snáší extrémní slunná a suchá stanoviště.
Odolná k Phytophthora.

Firma: Syngenta**Velikost nádoby:** 10-12 cm**Termín kvetení:** IV-X**Zaštipování:** Ne**Prodejní měsíc:** IV-IX**Regulátory růstu:** Pokud je to nutné**Výška:** 30-40 cm**Délka kultury po přesazení:** 8-11 týdnů**Expozice:** Slunce**Forma osiva:** Natural**CENA:** 2253,50 Kč (1000 semen)

Použití	Vhodná pro pěstování ve velkých nádobách. Miluje teplo a slunné lokality.
----------------	---

Kvetení	Neutrální k délce dne – vysoké množství světla a teploty vyšší jak 24 °C podporují kvetení.
----------------	---

Výsevní termín	Únor-březen.
-----------------------	--------------

Způsob výsevu	1-2 semena do jedné cely sadbovače.
----------------------	-------------------------------------

Klíčení (Fáze 1)	<p>Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. Kořínek se objeví za 7 dní.</p> <p>Zasypávání: Semena je možné zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby byla zajištěna tma a optimální vlhkost.</p> <p>Substrát: pH 5,5-5,8; EC do 0,5-0,75. Pravidelně kontrolujte pH substrátu, jelikož Vinca zvyšuje pH o 0,5-1. Substrát by neměl být příliš stlačený, aby mohly kořeny bez problému prorůst.</p> <p>Světlo: Tma je nutná pro klíčení.</p> <p>Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-7.</p> <p>Vzdušná vlhkost: 100 % po dny 1-7.</p> <p>Teplota: 24-25 °C:</p> <p>Hnojení: Udržujte EC 0,5-0,75.</p>
-------------------------	---

Mladé rostliny (Fáze 2-4)	<p>Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení (prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).</p> <p>Fáze 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den 8-16 - Snížíme vzdušnou vlhkost na 40 %. - Substrát: pH 5,5-5,8 a EC 1-1,25 - Světlo: 20 000-30 000 lux - Vlhkost substrátu: Střídáme mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3), substrát by měl proschnout na stupeň 3 během 18 hod.
----------------------------------	---

- Teplota: Jakmile jsou patrné děložní lístky, tak snížíme teplotu na 24-25,6 °C.
- Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 60-100 ppm dusíku.
- Fungicidy: Preventivně aplikujeme postřik mezi dnem 7 a 10.

Fáze 3 a 4:

Substrát: pH 5,5-5,8; EC 1,25-1,5.

Světlo: 35 000-50 000 lux.

Teplota: 24-25,6 °C.

Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Pokud substrát vyschne více než na stupeň 2, mohou se poškodit kořeny.

Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 75-125 ppm dusíku.

Regulátory růstu: Pokud je to nutné, lze aplikovat B-Nine (daminozide) v koncentraci 1 500-2 500 ppm.

Fungicidy: Doporučuje se aplikovat fungicidy.

**Následné
pěstování**

Přesazení: Rostliny jsou prodejné za 36-70 dní od přesazení.

Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,7-2,0.

Světlo: 50 000- 75 000 lux.

Teploty: 24-25,5 °C.

Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 4.

Vzdušná vlhkost: 40 %.

Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 100-150 ppm dusíku.

Regulátory růstu: Pokud je to nutné, lze aplikovat B-Nine (daminozide) v koncentraci 2 500-5 000 ppm.

Fungicidy: Doporučuje se aplikovat fungicidy.

**Choroby a
škůdci**

Choroby: Rhizoctonia, Pythium

Škůdci: mšice, smutnice

V nabídce 7 barev a směs (SY1110).



Apricot
SY1106



Cherry
SY1107



Lilac
SY1108



Magenta
SY1109



Mix
SY1110



Peach Blush
SY1111



Polka Dot
SY1112



Strawberry
SY1113

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.