



Mix SY1012

Druh: Antirrhinum majus	
Skupina: Liberty Classic F1	
Velice oblíbená skupina k řezu, silné stonky. Snadné pěstování. K dispozici po jednotlivých barvách nebo ve směsi.	
Firma: Syngenta	Velikost nádoby: 12-16 cm
Termín kvetení: III-X	Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: III-IX	Regulátory růstu: Pokud je to nutné
Výška: 45-55 cm	Délka kultury po přesazení: 12-13 týdnů
Expozice: Částečné slunce	
Forma osiva: Natural	
CENA: 255,40 Kč (1000 semen)	

Použití	Skupina vhodná k řezu, do nádob a krajinářských výsadeb.
Kvetení	Iniciace kvetení: den 16-20, 4-6 listů Fakultativně dlouhodobá rostlina – dlouhé dny podpoří kvetení. Mechanismus kvetení: Přisvětlování podpoří a uspořídá kvetení.
Výsevní termín	Konec února až březen.
Způsob výsevu	1-2 semena do jedné cely sadbovače.
Klíčení (Fáze 1)	Kořínek se objevuje za 3-4 dny od výsevu. Zasypávání: Semena se mohou zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela jednotná vlhkost. Substrát: pH 5,5-5,8; EC <0,75. Světlo: Pro klíčení není nutné. Pokud používáme klíčící komoru se zdrojem světla 100-1 000 lux, tak dosáhneme vyšší klíčivosti a kompaktnějších klíčenců v porovnání s klíčením ve tmě. Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 0-5 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve dnech 6-18 snížíme vlhkost na stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 19 snížíme dále na stupeň střední (2). Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. Teplota: Teplota 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek. Vyšší teploty zpomalují klíčení. Poté snížíme teplotu na 16-18 °C dokud ne nerozevrou děložní lístky. Hnojení: EC závlžkové vody s hnojivem by nemělo být vyšší než 0,5.
Mladé rostliny (Fáze 2-4)	Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění mladé rostliny celou sadbovače). Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,5-1,0. Vyšší pH může způsobit nedostatek železa, který se projevuje chlorózami výhonu. Vyšší EC může způsobit aborci růstového

	<p>vrcholu.</p> <p>Světlo: Zajistěte 20 000-30 000 lux. Množství světla by nemělo přesáhnout 30 000 lux. Pokud chceme uspíšit kvetení, přisvětlujeme 3 000- 4 500 lux po dobu 14 hodin. Dny kratší než 12 hodin podporují vegetativní růst, ale oddalují kvetení.</p> <p>Teplota: 18-20 °C. Postupně jak se vyvíjí mladé rostliny, snižujeme teplotu na 17-18 °C.</p> <p>Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Zaléváme brzy ráno a zajistíme dobrou ventilaci, tím předejdeme aborci růstového vrcholu, ke které může dojít při malém množství světla, nízkých teplotách a vysoké vlhkosti. Aborce růstového vrcholu se může stát, když jsou rostliny mokré přes noc.</p> <p>Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík.</p> <p>Hnojení: Pokud je to nutné, začneme hnojit rostliny 25-50 ppm dusíku hnojivem o Ca základu (13-2-13 nebo 14-4-14). Vyvinuté rostliny se mohou hnojit 100 ppm dusíku. Chloróza spodních listů je projevem přebytku amoniaku.</p> <p>Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme postřik B-Nine (daminozide), koncentrace 2 500-5 000 ppm.</p>
--	--

Následné pěstování	<p>Přesazení: Možné přesazovat za 6-7 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami.</p> <p>Substrát: pH 5,5-5,8; EC 1,0-1,5. Vysoké pH může způsobovat nedostatek železa, naopak nízké pH vede k toxicitě sodíku. Hledíky jsou velice citlivé na zasolení substrátu.</p> <p>Světlo: Hledíky jsou dlouhodobní rostliny. Vyžadují dostatek světla. Přisvětlování v době malého množství světla podpoří kvetení.</p> <p>Teploty: Noční teploty 10-14 °C, denní 16-22 °C.</p> <p>Vlhkost substrátu: Kolísání mezi vlhký (3) a střední (2). Před další zálivkou nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 3.</p> <p>Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík.</p> <p>Hnojení: Hnojíme 150-200 ppm dusíku hnojivem o Ca základu (13-2-13 nebo 14-4-14). Pokud jsou nízké teploty, tak se snažíme vyhnout hnojivům o amonném základu, jelikož může poškodit kořeny.</p> <p>Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme 1-2 postřiky B-Nine (daminozode), koncentrace 2 500-5 000 ppm. v</p>
---------------------------	--

Choroby a škůdci	<p>Choroby: botrytida, padlí, pythium, virus bronzovitosti rajčete</p> <p>Škůdci: mšice, svilušky, třásněnka</p>
-------------------------	--

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.

V nabídce 7 čistých barev a směs (SY1012).



Bronze SY1009



Crimson SY1010



Lavender SY1011



Rose Pink SY1013



Scarlet SY1014



Yellow SY1016



White SY1015



Mix SY1012