



**Deep Blue V1972 / C**

<b>Druh:</b> Scabiosa caucasica	
<b>Skupina:</b> Fama®	
Trvalka kvetoucí prvním rokem bez nutnosti vernalizace. Již prvním rokem 15-25 stonků zakončených modrým resp. bílým květem.	
<b>Firma:</b> Benary	<b>Expozice:</b> Slunce-částečný stín
<b>Délka kultury:</b> 15-20 týdnů	<b>Forma osiva:</b> Natural & Coat
<b>Výška:</b> 50 cm	<b>Užití:</b> kobercové výsadby, k řezu
<b>Teplotní zóna:</b> 9-5	
<b>Chladnostní zóna:</b> 12-8	
<b>CENA:</b> 1 454,30 Kč (500 semen), 1 482,10 Kč (500 Coated)	

<b>Použití</b>	Trvalka vhodná do krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a květináčů. Atraktivní i k řezu. Květy lákají včely a motýly.
<b>Výsevní termín</b>	
<b>Způsob výsevu</b>	1-2 semena do jedné cely sadbovače.
<b>Klíčení</b>	Fáze 1: 10-18 dní při teplotě 18-21 °C. Semena jen lehce zasypeme, udržujeme jednotnou vlhkost. Od fáze 2 snížíme vlhkost substrátu a kultivujeme spíše zasucha. Fáze 2-4: 16-18 °C.
<b>Následné pěstování</b>	Za 5-6 týdnů od výsevu přesazujeme po jedné rostlině do 13-15 cm květináčů nebo po 2-3 rostlinách do 3-5 l nádob. Při pěstování venku k řezu volíme spon 35-40x25-40 cm. Používáme podpurné sítě.
<b>Substrát</b>	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 1,5-3 kg/m <sup>3</sup> kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5. Venkovní pěstování: písčitojílovité až písčité půdy s dobrou drenáží, standardní vyhnojení 80-100 g/m <sup>2</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva.
<b>Teploty</b>	Pěstování při 12-15 °C nebo venku. Větráme od 18 °C. Nízké teploty zhoršují kvalitu rostlin a vedou k předčasnému kvetení. Rostliny přezimují vevnitř (při teplotách 2-5 °C, mimo mraz) nebo venku, kde je nutné rostliny přikrýt textilií. Pak mohou teploty klesnout až k -20 °C.
<b>Hnojení</b>	Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 2 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým hnojivem. Nehnojte po polovině září! Na jaře hnojíme 150-200 ppm dusíku hnojivem s dusičnanem draselným (poměr N:K <sub>2</sub> O je 1:1,5). Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi

chelátů železa.



**Deep Blue** V1972 / C



**White** V1980 / C

*Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.*