



Mix D2670 / P

Druh: Bellis perennis	
Skupina: Tasso®	
Skupina s velkými květy, které jsou plné, velké 4 cm. Velice atraktivní hrnková květina. Ranější než Habenera. Všechny barvy jednotně kvetou.	
Firma: Benary	Forma osiva: Pelety & Natural
Délka kultury: 20 týdnů	Užití: kobercové a krajinářské výsadby, hrnková květina
Výška: 12 cm	
Expozice: Slunce-částečný stín	
CENA: 154,00 Kč (1000 semen), 182,30 Kč (1000 pelet)	

Použití	Vhodné pro krajinářské výsadby, k ohraničení záhonů. Použití i jako hrnková.
Výsevní termín	Produkce hrnkových rostlin (bez mrazu): konec srpna až polovina září; produkce hrnkových rostlin (bez topení): polovina srpna až konec srpna.
Způsob výsevu	3-5 semen do jedné cely sadbovače.
Klíčení	Fáze 1 a 2: 14-21 dní při 18 °C, fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15 °C. Semena lehce zasypeme vermikulitem, aby se zachovala vlhkost a semena dobře klíčila, umístíme sadbovač na světlo. Ve fázi 1 je nutná 100% relativní vlhkost, od fáze 2 ji snižujeme. Nesejeme příliš nahusto (asi 1 g/m ²).
Následné pěstování	3-4 týdny po výsevu přesadit do 7-9 cm květináčů. V případě studené kultury, kdy rostliny zmrznou je nutné rostliny nahrnovat nejpozději na počátku října, aby se stihly ještě zakořenit. Přesazování rostlin do nádob je možné od poloviny zimy až po polovinu jara. Rostliny začnou kvést cca za 8-10 týdnů, kdy jsou pěstovány při 5-10 °C. Stejně pěstební podmínky jako jarní macešky.
Substrát	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-15 % organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra, kompost), 1 kg/m ³ kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m ³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2.
Teploty	Pěstování při 10-12 °C nebo venku. V zimě při pěstování uvnitř nesmí mrznout, udržujeme teplotu 3-5 °C. Pokud pěstujeme venku, je nutné rostliny zakrýt. V půlce prosince začínají rostliny růst po 5-7 týdnů při teplotě 10-12 °C. Pěstujeme v co nejchladnějších podmínkách, nesmí však mrznout. Teploty na 12 °C vedou k nadměrnému růstu listů, květní stopky jsou tenké a nenastane květní indukce. Teploty pod 6 °C oddalují tvorbu pupat. V teplém počasí je nutné větrat. Vysoké teploty v kombinaci s nedostatkem světla vedou k nejednotnému porostu a květy nejsou plné.
Hnojení	Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku (při 0 kg/m ³

pomalou se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití kompletního vyváženého hnojiva. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Rostliny přijímají minerály při teplotách nad 5 °C. Nehnojte po začátku října! Na jaře hnojení 150-200 ppm dusíku v hnojivu o draselném základu (poměr N:K₂O je 1:1,5). Kořeny jsou citlivé na vysoké koncentrace solí v substrátu.

V nabídce 5 čistých barev a směs (D2670 / P).



Deep Rose S2590 / P



Pink D2630 / P




Red D2640 / P



Strawberries & Cream D2600 / P



White D2650 / P



Mix D2670 / P

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.