



Mix Y1951

Druh: Zinnia elegans**Skupina:** Oklahoma

Skupina zinníí, které mají velké plné květy na pevných stopkách. Ideální pro produkci řezaných květin. Vysoký výnos, dobrý zdravotní stav. Květ 5 cm.

Firma: Benary**Forma osiva:** Natural**Délka kultury:** 10-12 týdnů**Užití:** kobercové výsadby, k řezu**Výška:** 88 cm**Expozice:** Slunce**CENA:** 122,00 Kč (1000 semen)

Použití	Skupina vhodná do kobercových výsadeb, k řezu a k pěstování v nádobách. Květy lákají včely a motýly.
Výsevní termín	Rychlení ve skleníku: únor až březen pro produkci kvetoucích rostlin od července dále; rychlení venku (mimo mráz): konec května; můžeme vysévat i přímo na stanoviště.
Způsob výsevu	1 semeno do jedné cely sadbovače.
Klíčení	Fáze 1: 7-10 dní, 20-22 °C; fáze 2: 5-7 dní při 20-21 °C; fáze 3: 7-10 dní při 18-20 °C; fáze 4: 17-18 °C. Klíčí za tmy. Výsev zakryjeme vrstvou vermikulitu, substrátu nebo písku. Od konce května je možné vysévat také přímo na stanoviště. Příliš nízké nebo příliš vysoké teploty zhoršují klíčení.
Následné pěstování	Po 3 týdnech od výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-11 cm květináčů nebo packů nebo po 3-4 rostlinách do 5-10 l nádob. Čím dříve se rostliny nahrnkují, tím je lepší kvalita. Pěstování venku: 4-6 týdnů po výsevu přesazujeme na stanoviště do řad ve vzdálenosti 18-25 cm. Používáme podpurné sítě.
Substrát	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m ³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,2. Venkovní pěstování: jílovité nebo písčité půdy s dobrou drenáží a obsahem humusu, standardní vyhnojení 80-100 g/m ² pomalu se uvolňujícího hnojiva.
Teploty	Pěstujeme při teplotách 15-16 °C nebo venku. Teploty pod 10 °C vedou ke žloutnutí listů. Zinnie dobře snáší vysoké teploty okolo 25 °C, ale nesnáší mráz. Před prodejem se doporučuje otužovat rostliny teplotami 12-14 °C. Při venkovním pěstování volíme spíše slunné lokality, chráníme před větrem.
Hnojení	Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nadbytek dusíku způsobuje slabé stonky, které se lámou. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Kořeny jsou citlivé na zasolení substrátu. Venkovní pěstování: minimální

obsah N v půdě 120 g N/m².

V nabídce v 7 barvách a směsi (Y1951).



Carmine Y1881



Golden Yellow Y1831



Ivory Y1891



Mix Y1951



Pink Y1861



Scarlet Y1871



Salmon Y1841



White Y1901

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.