



Návod na pěstování letničkových směsí z přímých výsevů



příprava stanoviště, důkladné odplevelení



výsev 2. pol. IV. – V. / pro snadnější výsev doporučeno smíchat osivo s pískem



zasekání směsi hráběmi



válcování



zálivka – vhodná na počátku vývoje rostlin, později pouze v případě sucha

Výběr stanoviště: Pro založení letničkového záhonu z přímého výsevu je vhodné stanoviště na plném slunci s možností závlahy. Je možné ho použít jak ve veřejné zeleni, tak v soukromých objektech - např. zahradách rodinných domů. Plochy vhodné pro použití tohoto typu záhonu jsou např. dopravní ostrůvky v sídlech, pásy podél komunikací, cyklostezek, kruhové objezdy, parky a parkově upravené plochy, kde je možné záhony zakládat podél cest, okolo laviček a jiných typů posezení, nebo volně v prostoru travnatých ploch, které mohou být letničkovou směsí zpestřeny a oživeny. Pro jejich zakládání jsou ideální bezplevelné plochy. Přímé výsevy je vhodné použít všude tam, kde očekáváme pestrost, biodiverzitu, proměnlivost a nevadí nám, že záhon nebude působit okamžitě, že v něm občas nějaká letnička po ukončení kvetení uschne.

Příprava stanoviště: Stanoviště je vhodné průběžně odplevelovat, zejména pokud zde byl dříve ruderální porost (nutná aplikace totálního herbicidu). Na podzim je možné stanoviště obdělat orbou a vyhnojit kompostem (cca 18 kg/m²), na jaře prokypřit, nakopat a urovnat hráběmi. Pro zajištění větší čistoty letničkové směsi, je vhodné (ale ne nezbytně nutné) před samotným výsevem na plochu záhonu rozprostřít 5-10 cm vrstvu sterilního substrátu, která zamezí většímu klíčení semen plevelů v půdě. Protože jsou letničky pěstitelskou skupinou rostlin, která je náročná na dostatek živin, vyhnojíme urovnanou plochu minerálním hnojivem (cca 20 g/m²). Na takto připravenou plochu již můžeme vysévat.

Založení záhonu: Při osévání větší plochy, je vhodné rozdělit záhon na několik menších částí a na stejné množství částí poté rozdělit i osivo. Při rozdělávání osiva je třeba dbát na neustálé promíchávání směsi, aby nedošlo k selektování druhů s rozdílnou velikostí semene a bylo zaručeno zastoupení všech druhů směsi

rovnoměrně po celém záhoně. Před vlastním výsevem doporučujeme osivo smísit s pískem a výsev provádět za bezvětřného počasí na široko, podobně jako při zakládání trávníku. V průběhu vysévání směs neustále promícháváme, aby nedocházelo k selekci osiva a druhy s drobnými semeny nezůstaly na dně. Vysetou směs je nutné zasekat hráběmi, uválcovat a je možné ji zalít.

Termín výsevu: Duben – polovina května s ohledem na aktuální stav počasí.

Doporučený výsevek: 2 g/m². Výsevek je možné zvýšit až na 5 g.

Zálivka: Vhodná do doby, než rostliny dosáhnou výšky cca 15 cm a v období dlouhotrvajícího sucha i v průběhu vegetace.

Počátek kvetení: Přibližně 6-8 týdnů po výsevu.

Odplevelování: Pokud dojde k výraznějšímu projevu plevelů, které by mohly potlačit Vaši letničkovou směs, je vhodné do záhonu vstoupit a odplevelit je vytržením plevelu, ne okopávkou. I když bude porost po odplevelení mírně polehaný a polámaný, letničky se s tím velice dobře vyrovnají a zanedlouho nebude ani patrné, že k nějakému zásahu došlo. Stačí pouze jedno odplevelení během celé vegetační sezóny, protože po zapojení porostu se již plevelu nemají šanci prosadit. Míra zaplevelení je přímo úměrná výchozímu stavu stanoviště.