



Mix K2991

Druh: Delphinium hybrida	
Skupina: Benary's Pacific	
Trvalka kvetoucí v prvním roce, není nutná vernalizace. Vyniká kvalitou květů a stonků. Ideální k řezu, dlouho vydrží ve váze.	
Firma: Benary	Expozice: Slunce
Délka kultury: 16 týdnů	Forma osiva: Natural
Výška: 120 cm	Užití: krajinářské výsadby, k řezu
Teplotní zóna: 6-1	
Chladnostní zóna: 2-7	
CENA: 228,70 Kč (1000 semen)	

Použití	Prvním rokem kvetoucí trvalka. Vhodná do kobercových výsadeb, výborná k řezu.
Výsevní termín	Venkovní rychlení: březen až duben; ve skleníku: prosinec až květen.
Způsob výsevu	2-3 semena do jedné cely sadbovače.
Klíčení	Fáze 1: 12-18 dní při teplotě 21-24 °C. Semena klíčí za tmy, proto po výsevu zasypáváme vermikulitem, pískem nebo substrátem. Když vyséváme venku, je nutné na počátku zajistit, aby byla půda vlhká, v žádném případě nemůže být suchá. První dny po výsevu se doporučuje výsev zakrýt fólií. Přemokřená půda také není vhodná.
Následné pěstování	4-6 týdnů po pikýrování přesazujeme po 1-3 rostlinách do 5-10 l nádob. Při pěstování v nádobách je nutné zajistit dostatečnou velikost nádoby, aby měly kořeny prostor k růstu. Pěstování venku: spon 25x25 cm (pěstování jako letnička) nebo 50x50 cm (pěstování jako trvalka). Rostlinám je nutné zajistit drátovou oporu.
Substrát	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (kůra, písek, perlit), 1-2 kg/m ³ kompletního vyváženého hnojiva, 2-4 kg/m ³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,5. Venkovní pěstování: půdy s dobrou drenáží, standardní vyhnojení 60-80 g/m ² pomalu se uvolňujícího hnojiva. Půdu neobohacujeme o rašelinu, pH 5,5-6,5.
Teploty	Pěstování za teplot 15-18 °C, od 20 °C nutné větrat. Vernalizace není nutná. V zimě přechováváme uvnitř, mimo mraz, teploty 3-5 °C nebo venku, kde rostliny zakryjme textilí. Rychlení 10-12 týdnů při teplotě 15-18 °C.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva) kompletním vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po kvetení nebo po začátku září! Na jaře hnojte 100-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa. Hnojení pomalu se uvolňujícím hnojivem je vhodnější, jelikož jsou kořeny velice citlivé na vysoké zasolení substrátu. Je lepší hnojit několikrát nižšími koncentracemi hnojiva než méně často vyššími. Venkovní pěstování: po řezu doplňkové hnojení 60-80 g/m² pomalu se uvolňujícím hnojivem o draselném základu. Nehnojte po kvetení.

V nabídce naleznete tyto odrůdy a směs (K2991):



Astolat
K2881



Black Knight
K2781



Blue Bird
K2831



Blue Jay
K2841



Cameliard
K2791



Galahad
K2951



Guinevere
K2851



King Arthur
K2811



Percival
K2821



Summer Skies
K2801

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.