



Pink M4601 / T

Druh: Geranium sanguineum	
Skupina: Vision®	
Světle nebo tmavě růžová odrůda trvalek. K dispozici i ApeX forma osiva, díky níž je klíčení semen rychlejší a kvalitnější (až o 30 % více rostlin).	
Firma: Benary	Expozice: Slunce
Délka kultury: 10-12 měsíců	Forma osiva: Natural & ApeX
Výška: 33 cm	Užití: krajinářské výsadby, hrnková květina
Teplotní zóna: 9-5	
Chladnostní zóna: 12-8	
CENA: 835,00 Kč (250 semen), 887,00 Kč (250 ApeX)	

Použití	Trvalka vhodná jako půdokryvná, do skalky, na extenzivní střešní výsadby, do kamenných stěn. Atraktivní také do nádob a květináčů. Láká včely.
Výsevní termín	Duben až kveten pro produkci nekvetoucích rostlin; červen-srpen pro produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.
Způsob výsevu	3-5 semen do jedné cely sadbovače, možný také přímý výsev do konečné nádoby.
Klíčení	10-14 dnů při 20 až 24 °C. Klíčí za tmy. Semena zasypeme substrátem, pískem nebo vermikulitem, aby se zachovala jednotná vlhkost. Před výsevem ošetřujeme substrát fungicidy. Od fáze 2 snížíme teplotu na 18-20 °C, sníží se i vlhkost substrátu.
Následné pěstování	4-6 týdnů po výsevu přesazujeme 1-3 rostliny do 8-10 cm květináčů nebo packů. Nádoby volíme nepřiliš velké, jelikož stálé zavlhčení substrátu veden k inhibici růstu. Možné také sázet po 3-5 rostlinách do 3-5 l nádob, pak jsou rostliny větší. K iniciaci kvetení je nutná vernalizace.
Substrát	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 0-15 % jílu, 0-15 % částic (např. perlit, písek, kůra), 1-2 kg/m ³ kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m ³ pomalu se rozpustného hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-7,5.
Teploty	Pěstování při 12-20 °C nebo venku. Přezimuje v interiéru (3-5 °C, nesnáší mráz) nebo venku, kde je nutné rostliny zakrýt textilií. Na počátku jara rostliny začínají růst 6-8 týdnů při denních teplotách 16-20 °C a nočních 14-18 °C. Vyšší teploty sice zkrátí délku kultury, ale rostliny nejsou kompaktní. Vernalizace je nutná, studená fáze min. 15 týdnů. Před prodejem je vhodné rostliny otužit při teplotách 12-15 °C.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při 2 kg/m³ pomalu rozpustného hnojiva v substrátu) ve vyváženém hnojivu. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku. Velmi vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje vytáhlé rostliny. Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme 80-100 ppm dusíku v komplexním vyváženém hnojivu. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa.



Pink M4601 / T



Violet M4631 / T

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.