



W6161T

Druh: Verbena bonariensis	
Odrůda: Finesse®	
Liliové květy, výška 120 cm. Velice zajímavá do krajinářských výsadeb a k řezu.	
Firma: Benary	Forma osiva: ApeX
Délka kultury: 12-14 týdnů	Užití: kobercové a krajinářské výsadby, k řezu
Výška: 120 cm	
Expozice: Slunce-částečný stín	
CENA: 307,50 Kč (1000 ApeX)	

Použití	Odrůda vhodná k pěstování v květináčích, nádobách a okenních truhlících. Zajímavá je také v krajinářských výsadbách, lze použít i k řezu.
----------------	---

Výsevní termín	Od února do dubna.
-----------------------	--------------------

Způsob výsevu	3-5 semen do jedné cely sadbovače.
----------------------	------------------------------------

Klíčení	5-10 dní při 21-24 °C. Klíčí na světle, výsev zasypáváme vrstvou vermikulitu a zakryjeme černou děrovanou fólií. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy. Semena necháme přes noc ve vodě. Nejlépe klíčí v částečně vlhkém až suchém substrátu.
----------------	--

Následné pěstování	5-7 týdnů po výsevu přesazujeme po 1-2 rostlinách do 8-11 cm květináčů nebo packů nebo po 3 rostlinách do 12-15 cm květináčů. K řezu: výsadba od května ve sponu 25x25 cm. Rostliny nesmí být vystaveny mrazu. Je vhodné používat podpurné sítě.
---------------------------	--

Substrát	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1-1,5 kg/m ³ kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m ³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. Venkovní pěstování: písčitojílovité půdy s humusem a dobrou drenáží, standardní vyhnojení 60-80 g/m ² pomalu se uvolňujícího hnojiva.
-----------------	--

Teploty	Pěstování při 14-18 °C. Pro brzký jarní prodej je vhodné rostliny otužit teplotami 10-12 °C po dobu 14 dní. Verbena nesnáší mráz.
----------------	---

Hnojení	Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 200-250 ppm dusíku (při 0 kg/m ³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), střídáme hnojivo s dusičnanem vápenatým a dusičnanem draselným (poměr N:K ₂ O je 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Obzvláště nutný je dostatek draslíku, jelikož snižuje riziko houbových chorob a zlepšuje vybarvení listů a květů. Doporučuje se preventivně aplikovat 1-2x síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa se předejde 1-2 aplikacemi chelátů železa.
----------------	--

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.