



Bright Red U8051

Druh: Ricinus communis	
Skupina: Carmencita	
Atraktivní solitéra, která je okrasná listem i plodem. JEDOVATÁ SEMENA, NESMÍ SE POŽÍVAT, UCHOVÁVÁME MIMO DOSAH DĚTÍ !!!!!	
Firma: Benary	Forma osiva: Natural
Délka kultury: 9-10 týdnů	Užití: kobercové
Výška: 150 cm	výsadby, hrnková
Expozice: Slunce	květina
CENA: 1318,00 Kč (500 semen)	

Použití	Atraktivní solitéra, vhodná k ohraničení záhonů a do výsadeb do nádob. Léčivá rostlina, okrasná listem i plodem.
Výsevní termín	Únor pro prodej od dubna dále; březen až duben pro prodej od května dále; polovina až konec června pro prodej od srpna dále.
Způsob výsevu	1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je ale přímý výsev do konečné nádoby.
Klíčení	6-12 dní při teplotě 18-22 °C. 24 hodin před výsevem namočíme semena do horké vody. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy, abychom předešli padání klíčnicích rostlin. Klíčí na světle, proto výsev lehce přimáčkneme, udržujeme rovnoměrnou vlhkost substrátu a výsev umístíme pod světlo, vyhneme se ale přímému slunečnímu světlu. Poté, co se objeví děložní lístky, hnojíme 1000 mg N/l kompletním vyváženým hnojivem. Snížíme vlhkost substrátu a teploty na 16-18 °C.
Následné pěstování	2-4 týdny po výsevu přesazujeme po 1-2 rostlinách do 14-16 cm květináče nebo po 1-2 rostlinách do 3-5 l nádoby.
Substrát	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-10 % částic (např. perlit, kůra nebo písek), 1,5-3 kg/m ³ kompletního vyváženého hnojiva, 0-5 kg/m ³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-7,0.
Teploty	Pěstování při 12-15 °C. Teploty pod 10 °C rostliny tolerují jen po krátkou dobu a zpomalují růst. Před prodejem je vhodné rostliny postupně otužovat při 10-12 °C. Ricinus nesnáší mráz.
Hnojení	Vysoké nároky na hnojení. Musíme se vyhnout vysokému obsahu amoniaku, dusíku a fosforu. Rostliny se hnojí týdně 300-350 ppm dusíku (při 0 kg/m ³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené hnojivo. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. Nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.

V nabídce ve dvou barvách.



Bright Red U8051



Pink U8071

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.