



L8891

Druh: Erysimum suffruticosum	
Odrůda: Gold Dust	
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Drobné, žluté, příjemně vonící květy.	
Firma: Benary	Expozice: Slunce- částečný stín
Délka kultury: 14-16 měsíců	Forma osiva: Natural
Výška: 25 cm	Užití: krajinářské výsadby, hrnková květina
Teplotní zóna: 9-2	
Chladnostní zóna: 4-7	
CENA: 85,00 Kč (1000 semen)	

Použití	Trvalka kvetoucí prvním rokem, vhodná do krajinářských výsadeb nebo do květináčů.
Výsevní termín	Únor až březen pro prodej kvetoucích rostlin od května dále; venkovní rychlení: srpen pro kvetení od března dále; rychlení ve skleníku (nesmí mrznout): září pro kvetení od března dále.
Způsob výsevu	1 semeno do jedné cely sadbovače.
Klíčení	6-12 dnů při 20 až 21 °C. Semena lehce zasypeme substrátem, pískem nebo vermikulitem, aby se zachovala jednotná vlhkost. Od fáze 2 snížíme teplotu na 15-18 °C, sníží se i vlhkost substrátu. Rostliny netolerují přemokření.
Následné pěstování	3-4 týdny po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 9-12 cm nádob.
Substrát	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (např. perlit, písek, kůra), 1,5-3 kg/m ³ kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m ³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-5,6.
Teploty	Pěstování při 10-15 °C nebo venku. Přezimuje v interiéru (3-5 °C, nesnáší mráz) nebo venku, kde je nutné rostliny zakrýt textilií. Na počátku jara (kalendářní týden 51 a dále) rostliny začínají růst při 12-15 °C. Teploty 8-10 °C prodlouží délku kultivace (celkově o 10-14 týdnů). Teploty pod 8 °C prodlouží délku kultivace o 4-6 týdnů. Vernalizace není pro tvorbu květů nutná, ale je dobré kultivovat co nejchladněji. To pak vede k lepšímu větvení rostlin a uniformnímu nástupu kvetení.
Hnojení	Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 2 kg/m ³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu) v hnojivu o draselném základu (poměr N:K ₂ O je 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku. Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku v draselném hnojivu.

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.