



V0771

Druh: Salvia x superba	
Odrůda: Dwarf Blue Queen	
Trvalka kvetoucí prvním rokem bez nutnosti vernalizace. Velké množství tmavě modrých květů. Vhodná pro jarní prodej i pro prodej na konci léta.	
Firma: Benary	Expozice: Slunce
Délka kultury: 13-15 týdnů	Forma osiva: Natural
Výška: 40 cm	Užití: kobercové a krajinářské výsadby
Teplotní zóna: 12-1	
Chladnostní zóna: 4-7	
CENA: 260,00 Kč (1000 semen)	

Použití	Trvalka vhodná do kobercových výsadeb, sesazovaných nádob a květináčů.
Výsevní termín	Leden až březen pro produkci kvetoucích rostlin od května dále; srpen až říjen pro produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.
Způsob výsevu	1-3 semena do jedné cely sadbovače.
Klíčení	10-21 dní při teplotě 22-25 °C. Semena klíčí na světle, proto výsev jen lehce zasypeme vermikulitem a udržujeme jednotnou vlhkost. Poté, co se objeví děložní lístky, snížíme teplotu na 18-20 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Výsev nevystavujeme přímému slunci.
Následné pěstování	Za 4-6 týdnů od výsevu přesazujeme po jedné rostlině do 9-10 cm nádob nebo po 1-3 rostlinách do 11-15 cm květináčů nebo packů. Možné je také přesadit 3 rostliny do 3-5 l nádob.
Substrát	Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 % částic (např. perlit, kůra nebo dřevní vlákna), 1-2 kg/m ³ kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m ³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-7,5.
Teploty	Pěstování při 10-18 °C nebo venku. Rostliny přezimují vevnitř (při teplotách 3-5 °C, mimo mraz) nebo venku, kde je nutné rostliny přikrýt textilií. Na jaře rostliny rychlíme 8-10 týdnů při teplotě 15-18 °C a za dlouhodobých podmínek. Nízké teploty 8-10 °C prodlouží kultivační dobu o 3-4 týdny. Vernalizace není nutná.
Hnojení	Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku (při 2 kg/m ³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje nežádoucí prodlužování stonků. Nehnojte po polovině září! Na jaře hnojíme 150-200 ppm dusíku hnojivem s dusičnanem draselným (poměr N:K ₂ O je 1:1,5). Kořeny jsou velmi citlivé na zasolení substrátu, proto je vhodnější hnojit častěji, ale menšími koncentracemi.

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.